



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI OLT



Str. Crișan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013
Telefon/Fax 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspolt@dspolt.ro

COMUNICAT DE PRESĂ ZILEI MONDIALE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI 2018

Direcția de Sănătate Publică a județului Olt desfășoară în perioada 24 martie- 10 aprilie 2018 campania privind „Ziua Mondială Împotriva Tuberculozei”.

Scopul campaniei este de a preveni și elimina boala, prin creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului larg și prin impulsivarea factorilor de decizie de a lua măsuri suplimentare împotriva tuberculozei.

Cu toate că tuberculoza este o boală ce își face simțită prezența de milenii, agentul microbian incriminat drept cauză a fost descoperit în urmă cu mai bine de 130 de ani iar chimio-antibioticele încep practic să fie utilizate de la începutul anilor '50 ai secolului trecut, tuberculoza rămâne un pericol permanent pentru populație, o problemă prioritară de sănătate publică a unui însemnat număr de țări. Deși, în timp și în lume s-au înregistrat numeroase progrese în combaterea tuberculozei, aspectele inedite de ordin medico-social pe care le generează constant boala impun o fermitate fără precedent a măsurilor de limitare, reducere și în final eliminare a acesteia.

Raportul Global pentru Tuberculoză din 2017 al OMS arată că 53 milioane de vieți au fost salvate prin diagnostic efectiv și tratament în perioada 2000-2016. În 2016, 10,4 milioane de persoane aveau tuberculoză (6,3 milioane cazuri noi, 90% au fost adulți, 35% au fost femei și 1 milion copii). 1,7 milioane au decedat prin această boală, inclusiv 0,4 milioane la persoanele cu co-infecție HIV. Dintre copii, 1 milion s-au îmbolnăvit de tuberculoză și 250.000 au decedat prin boală, inclusiv cei cu HIV. Majoritatea cazurilor noi în 2016 s-au înregistrat în Asia de Sud-Est (45%), regiunea africană OMS (25%) și a Pacificului de Vest (17%); s-au înregistrat mai puține cazuri în regiunea est-mediteraneană (7%), regiunea europeană a OMS (3%) și regiunea OMS din America (3%).

În România, la sfârșitul anului 2016, erau în evidență 12.790 cazuri noi și recăderi, 10.738 de cazuri noi TB, dintre care 591 de cazuri noi la copiii 0 – 14 ani și 576 cazuri au fost înregistrate cu rezistență la medicamente. S-au înregistrat 969 decese, 785 la sexul masculin și 184 la sexul feminin.

În 2016, conform buletinului informativ al INSP, cele mai multe cazuri noi au fost înregistrate în județele: Tulcea 85.1/100.000 locuitori, Giurgiu 82.7/100.000 locuitori, Teleorman 81.7/100.000 locuitori.

La nivelul județului Olt, în anul 2017 s-au înregistrat 430 cazuri de TBC, dintre care 332 cazuri noi și 98 recidive. Dintre cele 332 cazuri noi 5 au fost copii. La sfârșitul anului 2017 în urma tratamentului au rămas în evidență 415 cazuri din care 3 copii.

Sloganul de anul acesta al Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei este:

**DORINȚĂ: LIDERI PENTRU O LUME FĂRĂ TUBERCULOZĂ! PUTEȚI FACE ISTORIE.
OPRIȚI TUBERCULOZA!**

La nivel județean, coordonarea campaniei este asigurată de Compartimentul Evaluare și Promovare a Sănătății al Direcției de Sănătate Publică Județeană OLT. În cadrul acestei campanii vor fi derulate o serie de acțiuni:

- publicarea pe website-ul DSP de materiale informative privind tuberculoza;
- transmiterea pe suport electronic de materiale informative către cabinetele medicilor de familie și către cabinetele medicale școlare;
- distribuirea de materiale informative către asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari în vederea desfășurării de acțiuni în comunități privind prevenirea tuberculozei;
- informarea elevilor din școli și licee privind tuberculoza (teme; ce este tuberculoza, caile de transmitere diferentă dintre infecția TBC și boala TBC, simptome, tratament) și distribuire de materiale informative (pliante).
- acțiuni stradale de informare a populației generale privind TBC, prin distribuire de materiale informative (pliante).



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI OLT



Str. Crișan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013
Telefon/Fax 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspolt@dspolt.ro

Tuberculoza trebuie să fie eliminată în lume în timpul vieții copiilor de azi iar decesele cauzate de această boală trebuie să atingă nivelul zero în timpul vieții adulților. Pentru a putea trăi într-o lume fără tuberculoză avem nevoie de un tratament mai rapid, un test ieftin, simplu și rapid, un vaccin eficient și zero decese prin tuberculoză.

Tuberculoza -este o problemă de sănătate publică. În fiecare secundă, în lume, un om este infectat cu bacilul Koch. Tuberculoza este cea mai răspândită și mai persistentă boală infecțioasă la om. Aproximativ o treime din populația globului este infectată cu mycobacteria producătoare de tuberculoză. Fiecare individ cu tuberculoză activă poate infecta în medie între 10 și 15 persoane pe an.

Factorii de risc în apariția TB:

- _ contact cu pacienți de TB;
- _ persoana vine dintr-un focar de TB;
- _ prezenta bolilor cronice, ce compromit răspunsul imunitar adecvat (DZ, etiismul cronic, infecția HIV/SIDA, tabagismul);
- _ poluarea mediului casnic;
- _ noxe profesionale;
- _ condiții precare de trai;
- _ alimentația precară.

Factorii de risc în infecția tuberculoasă:

- _ suprasolicitare fizică;
- _ factorii nocivi din mediul ambiant;
- _ factorii nocivi profesionali.

Tuberculoza se transmite preponderent pe cale aeriană (prin aer).

Sursa este bolnavul de tuberculoză pulmonară care: tușește, vorbește, strănută sau cântă. **MICROBII SE ELIMINĂ ÎN AER** și sunt inhalați de către cei din jur.

Orice persoană aflată în apropierea bolnavului poate face boala. Microbii ajung în plămâni unde se dezvoltă boala. Cei mai sensibili sunt însă copiii, care pot face tuberculoză pulmonară dar și alte forme grave de tuberculoză (tuberculoză osoasă, renală, meningită etc). Mai gravă este transmiterea (în același mod) a tuberculozei cu germeni rezistenți.

Profilaxia tuberculozei

Deoarece TB este o boală contagioasă, cu un agent patogen cunoscut, profilaxia ei se poate realiza pe câteva cai, care nu se exclud, ci sunt complementare: profilaxia socială și sanitară, profilaxia specifică (vaccinarea și revaccinarea BCG) și chimioprofilaxia.

Profilaxia socială este îndreptată spre:

- _ ameliorarea condițiilor mediului ambiant;
- _ îmbunătățirea bunăstării materiale a populației;
- _ fortificarea sănătății populației;
- _ ameliorarea condițiilor de alimentare și de trai;
- _ modul sanatos de viață;
- _ activități de prevenire și combatere a alcoolismului, narcomaniei, tabagismului și altor vicii.

Profilaxia generală

- _ adoptarea unui stil de viață sanatos;
- _ limitarea contactului persoanelor bolnave de TB activă (*indeosebi eliminarii de bacili*) cu oamenii sănătoși, acasă și la serviciu, prin realizarea măsurilor sociale, antiepidemice și curative în focarele de infecție TB.

Profilaxia specifică (vaccinarea)

Indicații:

- Se aplică la nou-născuți, la vârsta de 3-5 zile.

Directia de Sanatate Publica Olt
Dr. Andrei IORDACHE

